

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

# Erbamat

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

**Nome:** Erbamat B.

**Codice:** 418

**Sinonimi ufficiali:** (401) Verdealbara B.

**Data di ammissione:** 27/03/2009, decreto pubblicato sulla G.U. 146 del 26/06/2009

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

*Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: - Estratto dalla domanda di iscrizione della varietà al Registro Nazionale presso il MIPAAF*

### 2.1. Sinonimi ed eventuali errati

Con Decreto del 30 Maggio 2018, pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 133 dell 11/06/2018, è stata riconosciuta la sinonimia tra il Erbamat B. (418) e Verdealbara B. (401).

### 2.2. Descrizione Ampelografica

#### Germoglio (lunghezza da 10 a 20 cm)

001 - Forma dell'estremità del germoglio: aperta

002 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sull'apice: assente

003 - Intensità della pigmentazione antocianica dell'estremità: nulla o leggerissima

004 - Densità dei peli striscianti (lunghi) sull'apice: forte

005 - Densità dei peli diritti (corti) sull'apice: nulla o leggerissima

- Asse del germoglio: eretto

- Colore dell'apice (escluso gli antociani): verde

Foglioline apicali (le prime tre a partire dall'apice)

- Aspetto del lembo delle foglioline apicali: spiegato

- Densità dei peli striscianti (lunghi) delle foglioline apicali: forte

- Densità dei peli diritti (corti) delle foglioline apicali: nulla o leggerissima

- Distribuzione della pigmentazione antocianica: assente

- Colore (escluso antociani): verde

#### Vitici

016 - Distribuzione sul tralcio: discontinua

017 - Lunghezza: media

- Tipo: trifidi

#### Foglia adulta

065 - Taglia: grande

066 - Lunghezza: media

067 - Forma del lembo: pentagonale

068 - Numero di lobi: cinque

069 - Colore della pagina superiore del lembo: verde medio o scuro

070 - Pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina superiore del lembo: nulla o leggerissima

071 - Pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo: nulla o leggerissima

072 - Depressione sulla pagina superiore del lembo (tra le nervature secondarie e terziarie): assente

073 - Ondulazione del lembo fra le nervature principali o secondarie: localizzata tra N1 e N2

074 - Profilo del lembo (taglio trasversale nel mezzo del lembo): revoluto

075 - Bollosità della pagina superiore del lembo (convessità tra le nervature di ultimo ordine): leggera

076 - Forma dei denti: a lati rettilinei

077 - Lunghezza dei denti: medi

078 - Lunghezza dei denti in rapporto alla larghezza della loro base: lunghi

079 - Forma del seno peziolare: aperto

080 - Forma della base del seno peziolare: sagomata a U

082 - Forma dei seni laterali superiori: aperti, poco profondi

083 - Forma della base dei seni peziolari superiori: sagomata a U

- Forma dei seni laterali inferiori: aperti, poco profondi

- Forma della base dei seni peziolari inferiori: sagomati ad V

- Tomentosità della pagina inferiore: leggermente aracnoidea

084 - Densità dei peli striscianti tra le nervature della pagina inferiore: leggera

085 - Densità dei peli diritti tra le nervature della pagina inferiore: leggerissima

088 - Densità dei peli striscianti sulle nervature della pagina inferiore: leggera

089 - Densità dei peli diritti sulle nervature della pagina inferiore: nulla o leggerissima

#### Tralcio erbaceo

- Sezione trasversale: circolare
- Superficie: striata
- Tomentosità: leggermente aracnoideo, distribuzione del tomento diffusa

**Tralcio legnoso**

- 101 - Sezione trasversale: circolare
- 102 - Superficie: striata, non pruinosa
- 103 - Colore generale: giallo bruno
- Distribuzione del colore: uniforme
- 104 - Lenticelle: assenti
- Lunghezza: lungo
- Consistenza: robusto elastico
- Nodi: evidenti
- 105 - Densità dei peli diritti sui nodi: nulla o leggerissima
- 106 - Densità dei peli diritti sugli internodi: nulla o leggerissima
- Gemme: coniche, abbastanza evidenti
- Cercine peziolare: evidente

**Infiorescenza**

- 151 - Sesso del fiore: ermafrodita

**Grappolo a maturità industriale**

- Forma: cilindro conico
- Presenza di ali: non alato
- 203 - Lunghezza: media (18,7 cm)
- 204 - Compattezza del grappolo: molto compatto
- 206 - Lunghezza del peduncolo: corto-medio (4,5 cm)
- 502 - Peso medio del grappolo: medio (285 g)
- Resistenza alla diraspatura: bassa

**Acino**

- 220 - Larghezza: stretto (14,1 mm)
- 221 - Lunghezza: corto (14,4 mm)
- 223 - Forma dell'acino: circolare
- 224 - Sezione trasversale: circolare
- 225 - Colore: verde-giallo
- 227 - Pruina: forte
- 228 - Spessore della buccia: sottile ma resistente
- 230 - Colore della polpa: non colorata
- 232 - Succulenza della polpa: succosa
- 233 - Rendimento in succo: medio/elevato (70 %)
- 234 - Consistenza della polpa: consistente
- Grado di consistenza: elevato
- 236 - Sapore: neutro

238 - Lunghezza del pedicello: corto (4,5 mm)

503 - Peso medio dell'acino: basso (1,93 g)

**2.3. Fenologia**

Epoca di germogliamento: prima decade di Aprile (circa 3 giorni prima del Pinot bianco)

Epoca di fioritura: prima decade di Giugno (circa 5 giorni prima del Pinot bianco)

Epoca di maturazione: III-IV epoca

**2.4. Caratteristiche ed Attitudini culturali**

Vigoria: medio/forte.

Forma di allevamento: controspalliera con potatura a Guyot di media lunghezza (10-12 gemme).

Posizione del primo germoglio fruttifero: 2-3 gemma (2,3).

Produzione: media 143,6 q/ha, 3,6 Kg/ceppo, a volte con problemi di alternanza.

Resistenze: buona resistenza alle avversità climatiche ed agli agenti parassitari, tollerante all'oidio, discretamente resistente alla muffa grigia vista l'estrema compattezza del grappolo; nessuna sensibilità allo spacco dell'acino.

Comportamento nella moltiplicazione vegetativa: affinità d'innesto buona con i più comuni portainnesti.

**2.5. Utilizzazione**

Per la vinificazione.

**3. COLTIVAZIONE****3.1 Classificazione****3.1.1. Idonea**

Nella provincia di: Brescia

**3.2 DOP ed IGP**

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche.

**3.2.1. DOCG**

Franciacorta

#### 4. SUPERFICIE VITATA

Evoluzione della superficie vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970	1982	1990	2000	2010
-	-	-	-	24

#### 5. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2008 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2017	11.475	-	-	-
2016	2.950	-	-	-
2015	2.675	-	-	-
2013	162	-	-	-
2012	925	-	-	-

\* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005